

**LES NL DE DRAINAGE
DES TERRITOIRES CUTANES**

TETE ET COU	Oreille, front, œil, tempe, partie caudale du chanfrein	NL PAROTIDIEN	Palpable si hypertrophié
	Lèvres supérieures, région nasale latérale et	NL BUCCAL ET MANDIBULAIRE	Palpables
	Ensemble de la tête sauf oreille, tempe et occiput	NL MANDIBULAIRE	Palpables
	Occiput	NL RETROPHARYNGIEN	Palpable si hypertrophié
	Partie caudale de la tête, de l'oreille et du cou	NL PRESCAPULAIRE	Palpable
PAROI DU THORAX	Tiers crânio-dorsal	NL PRESCAPULAIRE	Palpables
	2 tiers crânio-dorsaux + partie ventrale et latérale	NL AXILLAIRE	Palpable si hypertrophié
		NL AXILLAIRE ACCESSOIRE	Palpable
MEMBRE ANTERIEUR	Face latérale et main	NL PRESCAPULAIRE	Palpables
	Face médiale	NL AXILLAIRE	Palpable si hypertrophié
		NL AXILLAIRE ACCESSOIRE	Palpable
PAROI ABDOMINALE	Partie crâniale	NL AXILLAIRE	Palpable si hypertrophié
		NL AXILLAIRE ACCESSOIRE	Palpable
	Zone ventrale de partie moyenne et caudale + prépuce, scrotum, vulve	NL INGUINAUX SUPERFICIELS	Palpables
	Zone dorsale de partie moyenne et caudale + lombes, bassin, queue et anus	NL ILIAQUES MEDIAUX	Visualisables en échographie
MEMBRE POSTERIEUR	Face médiale	NL INGUINAUX SUPERFICIELS	Palpables
	Face latérale et pieds	NL POPLITE	Palpable.

**LOCALISATION ANATOMIQUE
 DE QUELQUES NL DE DRAINAGE
 DES TERRITOIRES CUTANES**

